

ご使用前に、この説明文をよくお読みください。
また必要な時に読めるように保管してください。

第2類医薬品

コトブキ浣腸10

(情報は小箱に直接記載)

[使用上の注意]

してはいけないこと

連用しないこと (常用すると、効果が減弱し〈いわゆる“なれ”が生じ〉薬剤にたよりがちになる。)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。)
- (3) 1歳未満の乳児。
- (4) 高齢者。
- (5) 激しい腹痛、吐き気・嘔吐、痔出血のある人。
- (6) 心臓病の診断を受けた人。

2. 2～3回使用しても排便がない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

その他の注意

次の症状があらわれることがある

立ちくらみ、肛門部の熱感、快感

[効能・効果]

便秘

[用法・用量]

1歳以上6歳未満1回1個(10g)を直腸内に注入します。

1歳未満の乳児に使用する場合は、1回1個の約半量(約5g)を容器の1/2線により量り、直腸内に注入します。なお、使用残液は廃棄してください。


それで効果のみられない場合には、さらに同量をもう一度注入してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんすること。
(使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがある。)
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (4) 特に乳幼児の場合は安易な使用を避け、浣腸にたよりにすぎないように注意すること。
- (5) 浣腸にのみ使用すること。
- (6) 無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意してください。
- (7) 冬季は容器を温湯(40℃)に入れ、体温近くまで温めると快適に使用できます。

[使用方法]

- ① 容器先端のキャップを外し、肛門部へなるべく深く挿入します。
(滑らかに挿入できない場合は、薬液を少し出し、先端周囲をぬらすと挿入しやすくなります。)
- ② 容器を押しつぶしながらゆっくりと薬液を注入します。
- ③ 薬液注入後、2～5分がまんして十分便意が強まってから排便してください。



[成分・分量]

本品1個（10g）中

日局 グリセリン：5.0g

添加物として：ベンザルコニウム塩化物含有
溶剤として精製水

[保管及び取扱い上の注意]


- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)

[包装]

10g × 4個入り

[便秘しがちな方のために]

1. 規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間をきめて一定時間トイレに入るよう心がけてください。
また、便意をもよおした時は、がまんせずトイレに行ってください。
2. 繊維質の多い食べ物と水分を多くとるように心がけてください。
(例：野菜類・果物・コンニャク・カンテン・海藻等)
3. 適度な運動、腹部マッサージ等を行うよう心がけてください。
4. 早朝、起きがけに冷たい水または牛乳等を飲むと、便意をもよおしやすくなります。

お問合せ先 ムネ製薬株式会社 お客様相談室
電話番号：0120-85-0107
受付時間：8：30～17：00（土日祝を除く）
製造販売元  ムネ製薬株式会社
兵庫県淡路市尾崎 859
<http://www.mune-seiyaku.co.jp>

(独)医薬品医療機器総合機構 副作用救済制度 ☎0120-149-931

10g enema

Composition：

Each 10g contains 5g of glycerin(Jp) and benzalkonium chloride as an additive.

Dosage and administration:

For children over 1 year and up to 6 years of age, one unit(10g) at a time is administered rectally. In case of infant under 1 yaer of age , a hafe dosage(approximatery 5g) up to the 1/2 line on the container administered rectally. Discard the remaining hafe.If this dosage does not relieve constipation,the same dosage can be administred again.

Indications:

Constipation

Made in Japan