



グリセリン浣腸液50%「ムネ」の使用方法

1




容器のキャップをつけたまま温湯(約40℃)に入れ体温近くまで温めます。

2




注入管(チューブ)を持ち先端のキャップを回しながら取り外し、容器内の空気をできる限り追い出します。

3





ストッパーを挿入深度に合わせます。
先端部の周囲を浣腸液で潤すか、あるいはオリーブ油、ワセリン等を塗布して挿入しやすくします。

4



体は側臥位にしストッパーの後ろを持ちながら注入管(チューブ)をゆっくり肛門内に挿入します。


- ストッパーは肛門内に挿入しないこと。
- 無理に挿入すると、直腸粘膜を損傷する場合があるので注意すること。
- 立位では、直腸穿孔のおそれがあるので行わないこと。



小児は図のような姿勢にして両足を支え、注入管(チューブ)をゆっくり肛門内に挿入します。

- 注入管(チューブ)を挿入する長さは、成人で5~6cm、小児で3~6cmまでにする。

5



注入管(チューブ)を片手で固定し、他方の手で容器後部を少し上方に傾けて、ボトル部分を握りゆっくりと浣腸液を注入します。注入後、脱脂綿などで肛門をおさえておいて下さい。



薬液注入後、約2~5分経過し、便意が強まってから排便して下さい。
※150mLはアコーディオンタイプではありません。