

本品の使用前に、この説明事項を必ずお読みください

平成 27 年 3 月作成

第 3 類医薬品

泡ジーケア

(情報は小箱に直接記載)

⚠ [使用上の注意]

👤 [相談すること]

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 患部が広範囲の人
- (4) 深い傷やひどいやけどの人

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6 日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[効能・効果]

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

[用法・用量]

1 日数回、適量を患部に直接塗布又はガーゼ、脱脂綿等に泡状にのせ塗布する。

<用法・用量に関する注意>

- ① 定められた用法・用量を厳守すること。
- ② 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- ③ 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- ④ 外用にのみ使用し、内服しないこと

[使用法]



<切傷、すり傷等の小さな傷に>

- ① 創面を清潔にします。
- ② 泡ジーケアの泡をガーゼ等の上に出します。
- ③ 患部に軽く塗布して、残った泡を数十秒後に拭き取ります。

[成分・分量]本品(100mL)中

クロルフェニラミンマレイン酸塩・・・200mg

アラントイン・・・・・・・・・・・・・・200mg


ベンザルコニウム塩化物液・・・・・・100mg

添加物:ラウリン酸ジエタノールアミド、エデト酸 Na 水和物、エタノール

[保管及び取扱い上の注意]

- ①小児の手の届かない所に保管すること。
- ②直射日光の当たらない涼しい所に保管すること
- ③誤用を避け、品質を保持するため他の容器に入れ替えないこと
- ④使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

[包装] 80mL×1個入

発売元  ムネ製薬株式会社
兵庫県淡路市尾崎 859 電話：0120-85-0107
お客様窓口
受付時間 8：30～17：00（土日祝を除く）
<http://www.mune-seiyaku.co.jp>

製造販売元 大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷 3-14-16

副作用被害救済制度の問合せ先 (独)医薬品医療機器総合機構 電話:0120-149-931
